


D-SARTAN

TELMISARTAN 4 mg/ml

**Innovación respaldada
por la experiencia**



Primera terapia dual para la Enfermedad Renal Crónica (ERC) e Hipertensión (HTA) en perros y gatos



DERMOVET
SALUD PARA LAS MASCOTAS

Estadificación de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en perros y gatos

		ESTADIO 1 Sin azoemia (creatinina normal)	ESTADIO 2 Azotemia leve (creatinina normal o ligeramente elevada)	ESTADIO 3 Azotemia moderada	ESTADIO 4 Azotemia intensa
Creatinina en $\mu\text{mol/L}$ Estadio según la creatinina estable	Canina	 Menos de 125 (1,4 mg/dL)	 125 – 250 (1,4 – 2,8 mg/dL)	 251 – 440 (2,9 – 5,0 mg/dL)	 Mayor de 440 (5,0 mg/dL)
	Felina	Menos de 140 (1,6 mg/dL)	140 – 250 (1,6–2,8 mg/dL)	251 – 440 (2,9 – 5,0 mg/dL)	Mayor de 440 (5,0 mg/dL)
SDMA en $\mu\text{g/dL}$ Estadio según la SDMA estable	Canina	Menos de 18	18 – 35	36 – 54	Mayor de 54
	Felina	Menos de 18	18 – 25	26 – 38	Mayor de 38
UPC ratio Estadificación basada en la proteinuria	Canina	Sin proteinuria <0,2 Proteinuria en el límite 0,2 – 0,5 Proteinuria >0,5			
	Felina	Felina Sin proteinuria <0,2 Proteinuria en el límite 0,2 – 0,4 Proteinuria >0,4			
Presión arterial sistólica en mm Hg Estadificación basada en la presión arterial		Normotenso <140 Prehipertenso 140 – 159 Hipertenso 160 – 179 Hipertenso acusado ≥ 180			




Factores de riesgo en la ERC

- | | |
|---|--|
| Factores de susceptibilidad <ul style="list-style-type: none"> • Especie • Adulto mayor • Genéticos • Reducción de la masa renal • Factores geográficos | Factores asociados a comorbilidades <ul style="list-style-type: none"> • Cardiopatías • Hepática • Enfermedades inflamatorias • Enfermedades infecciosas • Endocrinopatías • Fármacos • Obstrucción urinaria crónica |
| Factores de progresión de la enfermedad <ul style="list-style-type: none"> • Proteinuria • Hipertensión arterial sistémica • Hiperfosfatemia | Factores de complicación o terminales (incrementan la morbilidad y mortalidad) <ul style="list-style-type: none"> • Anemia • Hipoalbuminemia • Alteraciones metabólicas |


Una solución para dos patologías

Composición y Mecanismo de Acción Telmisartán 4 mg/ml.

- Formulación oral: antagonista del receptor AT1 de la Angiotensina II. (o directo ARA II)
- Acción dual:- Reducción de proteinuria: protege la función renal a largo plazo
- Control de presión arterial: previene daño cardíaco y vascular.



Acción molecular del Telmisartán sobre el receptor AT1.





D-SARTAN

TELMISARTAN 4 mg/ml

