



Trazodona Clorhidrato 40 mg Trazodona Clorhidrato 80 mg Trazodona Clorhidrato 160 mg Ansiofílico - Antiestrés



DERMOVET
SALUD PARA LAS MASCOTAS

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA

Presentaciones:

Cada comprimido de 600 mg contiene: 160 mg de Trazodona clorhidrato y agentes de formulación c.s.

Cada comprimido de 300 mg contiene: 80 mg de Trazodona clorhidrato y agentes de formulación c.s.

Cada comprimido de 150 mg contiene: 40 mg de Trazodona clorhidrato y agentes de formulación c.s.

Especies de destino: Caninos y felinos.

Modo de uso: Comprimido de administración oral.

Indicaciones de uso: D-ZADONA es un comprimido a base de Trazodona HCl. En **perros** está indicado para el tratamiento de los trastornos del comportamiento como la ansiedad, ansiedad por separación, signos conductuales de estrés y de fobias a ruidos intensos como tormentas y pirotecnia. Indicado también como agente sedante, como parte de la medicación previa a una cirugía y como tratamiento tranquilizante posquirúrgico. Los efectos de la trazodona se observan dentro de los primeros 90 minutos luego de la administración.

Puede utilizarse como monodroga o como adyuvante en el tratamiento combinado con inhibidores de la recaptación de la serotonina, antidepresivos tricíclicos o benzodicepinas.

En **gatos** está indicada para disminuir la ansiedad previa a visitas al veterinario u otras situaciones puntuales de estrés. Puede combinarse con gabapentina (10 mg/kg) para potenciar los efectos sedantes.

Propiedades Farmacológicas: La Trazodona se clasifica como un inhibidor de la recaptación de serotonina (AIRS) y antagonista de los receptores 2A de serotonina, que potencia principalmente la actividad de serotonina en el SNC. En animales de laboratorio, la Trazodona inhibe de manera selectiva la captación de serotonina por parte de los sinaptosomas cerebrales y potencia los cambios conductuales inducidos por su precursor, el 5-hidroxitriptofano. En perros, la Trazodona ejerce efectos de conducción cardíaca cualitativamente diferentes y menos pronunciados que los de los antidepresivos tricíclicos. Puede actuar como antagonista de los receptores $\alpha 1$ -adrenérgicos y reducir la presión sanguínea. Como es antagonista de los receptores 5-HT₂ y causa su regulación por disminución, puede aumentar la eficacia de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

Propiedades Farmacocinéticas: En perros que recibieron 8 mg/kg por vía IV, los parámetros farmacocinéticos fueron los siguientes valores promedios; volumen de distribución: 2,53 L/kg; vida media de eliminación: 169 minutos; depuración plasmática corporal total: 11,15 mL/kg/minuto. La misma dosis cuando se administró por vía oral, tuvo una biodisponibilidad del 85% y una vida media de eliminación de 166 minutos; la concentración plasmática máxima fue alcanzada a los 445 minutos promedio después de la dosificación, pero presentó una variabilidad entre pacientes (+/-271 minutos).

Forma de administración: Los comprimidos pueden administrarse directamente en la boca del animal o mezclados con el alimento. Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación incorrecta No exceder la dosis recomendada.

Dosificación: CANINOS: Se sugiere comenzar con una dosis inicial de 3,5 a 5 mg/kg/12 horas durante los primeros 3 días para evaluar tolerancia y evitar la aparición de efectos adversos. Luego debe titularse al paciente hasta llegar a la dosis efectiva mínima. El rango de dosis terapéutica es de 7 a 12 mg/kg/8 – 12 hs. Un efecto sedante completo suele obtenerse a partir de las 2 semanas de tratamiento. Como dosis única previo a un evento estresante se sugiere 5 – 19,5 mg/kg. No superar los 300 mg/dosis o los 600 mg por día. En animales muy ansiosos o agresivos se recomienda administrar la dosis también la noche anterior al evento.

FELINOS: Para disminuir la ansiedad previo a visitas al veterinario u otras situaciones puntuales de estrés, la bibliografía recomienda una dosis de 5 mg/kg con un rango de dosis de 7 a 15 mg/kg.

Comprimido de 150 mg de peso - 40 mg de Trazodona HCl: CANINOS: 1 comprimido cada 10 kg de peso cada 12 hs durante los primeros 3 días para evaluar tolerancia y evitar la aparición de efectos adversos. Luego debe titularse al paciente hasta llegar a la dosis efectiva mínima, pudiendo llegar a 2 a 3 comprimidos cada 10 kg de peso/8 a 12 horas. Un efecto sedante completo suele obtenerse a partir de las 2 semanas de tratamiento. Como dosis única previo a un evento estresante se sugiere 1 a 5 comprimidos cada 10 kg de peso. No superar los 300 mg/dosis o los 600 mg por día. En animales muy ansiosos o agresivos se recomienda administrar la dosis también la noche anterior al evento.

FELINOS: Para disminuir la ansiedad previo a visitas al veterinario u otras situaciones puntuales de estrés, se sugiere una dosis equivalente a 1 a 1 ½ comprimido cada 5 kg de peso, de 60 a 90 minutos previos al evento.

Comprimido de 300 mg de peso - 80 mg de Trazodona HCl: CANINOS: 1 comprimido cada 20 kg de peso cada 12 hs durante los primeros 3 días para evaluar tolerancia y evitar la aparición de efectos adversos. Luego debe titularse al paciente hasta llegar a la dosis efectiva mínima, pudiendo llegar a 2 a 3 comprimidos cada 20 kg de peso/8 a 12 horas. Un efecto sedante completo suele obtenerse a partir de las 2 semanas de tratamiento. Como dosis única previo a un evento estresante se sugiere 1 a 5 comprimidos cada 20 kg de peso. No superar los 300 mg/dosis o los 600 mg por día. En animales muy ansiosos o agresivos se recomienda administrar la dosis también la noche anterior al evento.

FELINOS: Para disminuir la ansiedad previo a visitas al veterinario u otras situaciones puntuales de estrés, se sugiere una dosis equivalente a ½ a ¾ comprimido cada 5 kg de peso, de 60 a 90 minutos previos al evento.

Comprimido de 600 mg de peso - 160 mg de Trazodona HCl: CANINOS: 1 comprimido cada 40 kg de peso cada 12 hs durante los primeros 3 días para evaluar tolerancia y evitar la aparición de efectos adversos. Luego debe titularse al paciente hasta llegar a la dosis efectiva mínima, pudiendo llegar a 2 a 3 comprimidos cada 40 kg de peso/8 a 12 horas. Un efecto sedante completo suele obtenerse a partir de las 3 semanas de tratamiento. Como dosis única previo a un evento estresante se sugiere 1 a 3 ½ comprimidos cada 40 kg de peso. No superar los 300 mg/dosis o los 600 mg por día. En animales muy ansiosos o agresivos se recomienda administrar la dosis también la noche anterior al evento.

Duración del tratamiento: El tratamiento puede variar desde única dosis a tratamientos prolongados, según cuadro clínico y criterio del médico Veterinario. Un efecto sedante completo suele obtenerse a partir de las 2 semanas de tratamiento.

Efectos colaterales posibles e interacciones medicamentosas: Los efectos adversos más comúnmente asociados con la administración oral de Trazodona en perros y gatos son leves. En perros, el perfil de efectos adversos de la Trazodona no está bien documentado, y se describen como efectos adversos más comunes ansiedad, vocalización, signos de agitación, mareo, somnolencia, jadeo, incontinencia urinaria, desinhibición y agresividad. La mayoría de estos efectos se resuelven con el tiempo y son autolimitantes. Sin requerir de un tratamiento adicional, un ajuste de la dosis o la necesidad de finalizar su administración. Pueden presentarse efectos adversos a nivel gastrointestinal como heces blandas, diarrea, constipación, vómito, sed excesiva. En gatos, puede presentarse sedación e inhibición conductual. No se han reportado casos de Síndrome Serotoninérgico pero este debe ser tomado en cuenta como diagnóstico diferencial en perros con signos clínicos consistentes con este síndrome. Las siguientes interacciones medicamentosas no están necesariamente contraindicadas, pero deben evaluarse los posibles riesgos y realizarse controles adicionales cuando sea apropiado. ANTIHIPERTENSIVOS: La Trazodona puede acentuar la reducción de la presión sanguínea y causar hipotensión. AINES: Aumenta el riesgo de desarrollo de sangrado gastrointestinal, se recomienda supervisión. DEPRESORES DEL SNC: El uso conjunto con Trazodona puede tener efectos depresores aditivos en el SNC. METOCLOPRAMIDA: Aumenta el riesgo de desarrollo del síndrome serotoninérgico.

Contraindicaciones y limitaciones de uso: La Trazodona HCl está contraindicada en pacientes hipersensibles a este fármaco y los que toman inhibidores de la monoaminooxidasa (incluido Amitraz). Debe ser usado con precaución en los pacientes con grave enfermedad cardíaca o compromiso hepático o renal. No utilizar en animales con glaucoma de ángulo cerrado dado que puede dilatar las pupilas. No se ha establecido la seguridad de su uso en hembras gestantes ni lactantes. El veterinario debe evaluar la relación costo-beneficio de su utilización.

Precauciones de Uso: Los comprimidos pueden administrarse directamente en la boca del animal o mezclados con el alimento. Debe manipularse con los cuidados y precauciones de cualquier otro medicamento. Se debe administrar con precaución en animales que reciben otros medicamentos inhibidores de la recaptación de la serotonina. No superar los 300 mg por dosis ni los 600 mg diarios. Puede administrarse con comida o con el estómago vacío. Luego de realizar una terapia crónica con trazodona y al momento de suspenderla, esta debe ser retirada de forma gradual.

Intoxicación y sobredosis en animales: A dosis terapéuticas posee un amplio margen de seguridad. Para ambas especies los signos por sobredosis pueden ser: sedación, letargia, ataxia y vómitos. No existe antídoto específico, estos efectos se resuelven con el tiempo y son autolimitantes.

Intoxicación en el hombre: Puede generar desórdenes psiquiátricos que incluyan somnolencia, ataxia, náuseas, vómitos, sequedad en la boca. En casos más graves, se han notificado coma, taquicardia, hipotensión, hiponatremia, convulsiones e insuficiencia respiratoria. Las características cardíacas pueden incluir bradicardia, prolongación del intervalo QT y Torsade de Pointes. Los síntomas pueden aparecer 24 horas o más después de una sobredosis. La sobredosis de trazodona en combinación con otros antidepresivos puede causar síndrome serotoninérgico. No existe antídoto específico. En caso de aparecer síntomas de intoxicación dirigirse al Médico con el envase del producto.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Conservar entre 15 y 30°C en su envase original y al resguardo de la luz solar directa.

Los envases deberán ser descartados según la legislación local vigente.



Certificado N°: 25-181
Establecimiento Elaborador N°: 8707

DERMOVET S.R.L.

Juramento 3170 – 10° Piso – Depto. A – CP (C1428D0D) - C.A.B.A. – Argentina

Tel.: (+54 11) 5368-0530 – Mail: fa@dermo.vet – Web: dermovet.com.ar